

RASS – Richmond Agitation Sedation Scale

modifiziert

Scale	Bezeichnung	Beschreibung	Ergänzung
+ 4	Aggressiv	Gewalttätiges und aggressives Verhalten, unmittelbare Gefahr für Personal	+ (+) , Spontanatmung Teilsponatanatmung Keine Spontanatmung
+ 3	Sehr Agitiert	Zieht oder entfernt Beatmungstubus/Kanüle oder Katheter, zeigt aggressive Tendenzen	
+ 2	Agitiert	Häufige ungezielte Bewegung, atmet gegen den Respirator	
+ 1	Unruhe	Ängstlich, aber Bewegungen nicht aggressiv oder lebhaft	
0	Wach und ruhig	Kommt zumindest kleinen Aufforderungen nach	
- 1	Schläfrig	Schläfrig, erwacht bei Ansprache (> 10 sec), hält Blickkontakt, presst/hustet evtl. nur kurze Phasen gegen den Respirator	
- 2	Leichte Sedierung	Erwacht kurz mit Blickkontakt bei Ansprache (< 10 sec), presst/hustet nur kurze Phasen gegen den Respirator	
- 3	Moderate Sedierung	Bewegung oder Augenöffnung bei Ansprache ohne Blickkontakt, presst/hustet nur kurze Phasen gegen den Respirator	
- 4	Tiefe Sedierung	Keine Reaktion auf Ansprache, aber kleine Bewegungen oder Augenöffnung durch körperlichen Reiz, presst evtl. kurze Phasen gegen den Respirator	
- 5	Nicht erweckbar	Keine Reaktion auf Ansprache, keine Bewegungen durch körperlichen Reiz	

© Daniel Wisser 2007

Durchführung: Der RASS wird nach Beschreibung ermittelt. Falls bei Beobachtung keine Reaktionen zu erkennen sind wird der Patient an den Schultern leicht geschüttelt. Dem Scale wird ein + hinzugefügt wenn Spontanatmung, ein (+) wenn Teilsponatanatmung und ein – wenn keine Spontanatmung auf dem Druck- oder Flow-Zeit Diagramm zu erkennen ist.